

8月24日は薬害根絶の日

薬害根絶は 私たち薬局の目標です

1999年8月24日、厚生省は、薬害エイズ事件の反省をふまえ、再発防止を決意して「根絶の碑」を庁舎正面に建立しました。

翌年から8月24日を「薬害根絶デー」とし、薬害被害者の団体・薬被連が国と交渉をおこなっています。私たちも、この日に合わせて薬害防止を訴えています。

薬害イレッサとは

イレッサは、イギリスに本社を置くアストラゼネカ社が開発した肺がん治療薬。2002年7月、5カ月という異例の速さで承認されました。

「副作用の少ない夢の新薬」という宣伝で売り出されました。しかし、現在まで6年半の間に787人の副作用死が報告されています。

医薬品の承認制度のあり方、宣伝広告・販売のあり方を問う裁判は、今年度中に結審を迎えます。



薬害肝炎とは

薬害肝炎は、出産・手術などの出血に止血剤として使われた血液製剤により、C型肝炎にかかった事件です。被害者が裁判を闘った結果、国は責任を認めて和解できました。

350万人のウイルス性肝炎患者全員が救済されることをめざし、肝炎対策基本法制定の運動を進めています

薬害の根絶に向けて「薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会」で活動しています。



こんなにあった日本の薬害

1956 ペニシリンショック

アレルギーによるショック死

1961 サリドマイド

睡眠薬を妊娠中に服用し、手足や耳に奇形をもった子どもが生れた。被害児は世界で数千人。日本約千人。日本では、レンツ博士の警告後、9カ月間も販売を継続。

1965 アンブル入りかぜ薬

大衆薬で死亡者。発売中止に

1970 スモン

下肢の麻痺や視力障害などの末梢神経障害が多発。70年に殺菌剤キノホルムが原因と判明。被害者約12000人。1935年には副作用の警告があったのに、整腸剤として大量販売した。

1971 クロロキン

抗マラリア薬による視力障害。

1983 薬害エイズ

エイズウイルスにより汚染された血液凝固因子製剤により血友病患者約1800人がHIVに感染した。アメリカでは安全な加熱製剤が83年に実用化。日本では85年まで危険な製剤が使用された。

1988 陣痛促進剤

陣痛促進剤により、母子の死亡や重大な障害を残す被害が続いた。医療機関に対する危険性情報の伝達不十分が原因。

1989 MMRワクチン

3種混合ワクチンにより死亡者や重い障害が発生

1993 ソリブジン

抗がん剤との併用で死亡者多数

1996 薬害ヤコブ病

脳外科手術に使用したドイツ製ヒト乾燥硬膜がプリオンで汚染。100名以上がヤコブ病を発症し、植物状態の後に死亡。アメリカでは87年に輸入を禁止。日本での使用禁止は10年遅れの97年。

2002 薬害肝炎

血液製剤でC型肝炎に感染した被害者が全国5地裁で提訴。

2002 薬害イレッサ

肺がん治療薬、発売直後から多数の副作用死。

2006 薬害タミフル

インフルエンザの治療薬を服用した後、飛び降りなど異常行動で死亡。2007年、10代の子どもには使用禁止に。

詳しく知りたい方は

- ・全国薬害被害者団体連絡協議会（薬被連）
- ・薬害資料館

<http://homepage1.nifty.com/hkr/yakugai/>
<http://www.mi-net.org/yakugai/>